CATALOGO DEI FUNGHI MANGERECCI, SOSPETTI E VELENOSI...

Francesco Valenti Serini

437
24

CATALOGO

DEI

FUNGHI MANGERECCI, SOSPETTI E VELENOSI

RACCOLTI IN DISEGNO ED IN RILIEVO

PER SERVIRE DI GUIDA AL POPOLO

OSSIA

MYCEOLOGIA-IGIENICO-TOXICOLOGICA POPOLARE

DEL

Cav. Dott. Francesco Valenti Serra

DI SIENA

1872

Siena, 1864 - Tip. Sordo-muti

437
24

Poichè l'Imperiale Accademia medica di Prega ha mostrato desiderio di sapere, nell'anno corrente 1864, ed ha proposto un premio a chi meglio fac conoscerr al volgo i corrittori che distinguono i *Funghi mangerecci* dai velenosi, dirbo ciò credo mio dovere rendor noto colla stampa, che in *Italia* vi ha qualche cosa di fatto rutorno a questo argomento interessantissimo

Il Catalogo semplice che qui presento, mostrerà tutte quelle che ho fatto, e che conservo presso di me da più di 42 anni a questa parte, e che avrei anche potuto pubblicare quando mi fosse piaciuto, e dal medesimo si potrà ritrovare la somma importanza del soggetto, la pazienza e la fatica impiegate per la esecuzione dei lavori

La Causa motrice di questa mia passione e mio specialità fu sempre e la è anche attualmente per ci dispiacere che provo nel sentire rinnovarsi troppo di sovente i casi tristi di avvelenamenti cagionati dai funghi, e dal non aver per anche veduto che questo ramo di sapere fosse parte di pubblico insegnamento nelle Università, mentre ne sarebbe immensamente meritevole

Animato totalmente e semplicemente da questo pensiero e per soddisfare almeno per la mia parte ai doveri di un buon cittadino (salus populi suprema lex esto) faccio sapere che ho imprenso 42 Tavole in rilievo, con gli oggetti colorati al naturale e le quali rappresentano i *Funghi deliziosamente mangerecci*, e *sospetti ed i velenosi destar*, dietro prove ripetute da Uomini sommi di ogni Paese,

Ciascuna Tavoletta rappresenta uno o più sperie di funghi in tutte le età, con tutti quei cambiamenti possibili, ai quali possono andar sottoposti nel corso più o meno breve della loro vita, tanto per cause esterne, quanto per le interne; tirchè non questa mostra non deve rimaner difficile al volgo anche il più rozzo, di distinguere una specie buona da una rettiva, e molto più in quante che vi sono gli sparroli, dai quali il popolo è già abituato a conoscerr, che se la rrrne del fungo e bianca può profittarne, mentre se cambia colore in rigetto come sospetto o velenoso.

Per eseguire questa mia Operazione è ben facile comprendere che non mi sono fidato di me stesso, ma ho dovuto ricorrere alle opere di molti autori celebri e antichi che moderni, tanto nostri, quanto di altre nazioni

Queste Tavolette in cartone non sono di cera, che richiedono troppo spese, e grandi riguardi, ma di altra carteria assai più durevole e meno costosa, sono accompagnate da altrettante Tavolette in disegno, perfettamente colorate al naturale che con i numeri corrispondono a quelle di mo-

tario. E siccome queste formerebbero è vero, un ammaestramento sempre utile pur il pubblico ma sterile per lo scienziato, vi ho aggiunto un *Trattato* nel quale dò in iscritto un *Uso* di tutte quelle specie di cui costa la mia fatica.

Le tavolette in rilievo, quando che sono eredute meritevoli possono esporsi in un Museo od in altro luogo pubblico, a mà d'esempio in un Municipio qualunque (Dio volesse che tutti i municipi ne avessero un modello) sicure di non essere attaccate dagli insetti o di non altro bisognose che di essere liberate di quando in quando dalla polvere e secondo dalle muffe e dalle cadute.

Esse sono precedute da 13 Tavolette della stessa dimensione ognuna con oggetto in rilievo marcate da lettere majuscole, che io chiamo alcune ELEMENTARI, e che formano una introduzione alla *Scienza Micologica* — *Igienico Popolare*.

In queste Tavole furono conosciute la struttura interna ed esterna dei Funghi, la formazione, le differenze e la importanza delle cosi della Coetina, la provenienza degli Anelli, le varietà e funzioni della volva, il luogo che occupano le sporule o corpi riproduttori nei generi diversi, il resultato dall imbibizione con diversi liquidi colorati, per vedere la struttura, e la forma delle cellule, delle quali sono composti i cappelli ed i piedi di quei funghi che ne sono provveduti.

Nel catalogo in ogni numero i nomi volgari delle specie e varietà non nulla tavole di materia vi sono i portullini con i nomi usuali italiani, francesi, inglesi e tedeschi con qualche nome scientifico di quell'Autore che mi è sembrato più conveniente.

Nel Testuto poi, oltre ai nomi volgari, vi ho unita la Sinonimia fatta da tutti i Micologi di ogni età, e di qualunque nazione ed a questa tengo dietro la storia completa di ciascuna specie dalla sua scoperta a questo porto, i caratteri distintivi e le mutazioni che fanno nel corso della vita, i sintomi di avvelenamento con i quali si annunziano i casi oltremodo spaventosi e compassionevoli pur avvelenamento dei funghi, la Cura pronta e ben diretta che si deve adottare, quando però, ne siamo in tempo, il resultato dall Antopsia, ed infine lo annuale nella ricerca, e nella preparazione di queste piante prima di farne uso perchè sono sempre facili ad ingannarci.

In conclusione dico, se ogni non mi oppongo che queste modo di agire mi sembra il più accorto per istruire il Popolo, o per renderlo almeno più accorto e men corrivo nell impiego di queste piante, dalle quali nemmeno lo Poliano fu pur ottavo e lo più vigilante può cimentarsi e questa modo, dissi, parmi più utile degli esempi dagli scritti delle descrizioni, e dalle opere le meglio architettate, le quali infine vanno o riposare negli scaffali dell Accademie o nella privata o pubbliche Biblioteche, o adagiarsi alla polvere agli insetti ed all Oblio, ove il popolo non ho motivo di andarvi ad il grande non le apre.

TAVOLE ELEMENTARI DI MYCEOLOGIA

marcate con lettere grandi

T A n°1. Pratajolo vecchio con speciale natore le quale sono radunate sopra un corpo a da foglie di Leccio e di Quercie ma perfette che si hanno prodotte molti individui dello stesso specie.

2 Il medesimo pratajolo nel quale si vede il pedunculo cavo

3 Foglia di quercia sulle quale si vede lo sviluppo dell Agarico, che conto di un corpicciolo sferico circondato da lanugine (Corcyto degl naturalisti, o Mycelium dei moderni)

4 Due foglie di leccio presso che come sopra

5 Molte foglie di quercie nelle quali i soddetti corpicciuoli hanno preso le figure di un fungo deciso

6 Sferie di un fungo del fungo

T B NASCITA DI ALCUNE SPECIE DI FUNGHI

n°1. Sfera filamentosa o gloso di Bytsus o rontfia bianco delle raccolta dagli antichi e micelium dei moderni

2. Delle soddette basi filamentosa che ho orquisita della consistenza di e olizio un bernoccolo rotonda bianco, essia un fungo informe

3 Il bernoccolo bianco prodotto dell ordinamento della predetta base filamentosa, ho posto i vermicelletti di una colice

n°4. Disposizione visibile delle base filamentosa per l ammento del fungo il quale oltre ad essere molto sviluppato si è pronunziato per una varietà di pariolelo.

— Nota —

La carcyto non dà sempre origine ad un solo individuo, ma talvolta ne produce molti come per esempio, in quello specie che narrano a gruppi, ostro ori cori detti respitosi.

T C Forme varie dei peduncoli frotto esterno quanto interno di tutte le specie di funghi da me conosciute

T D Forme varie delle Borse o volve membranose delle diverse specie o varietà di esse, o volvarie, delle quali secondo ciò che ne penso, si ne può riservare un carattere molto importante

T E. Forme varie dei Cappelli in quei genere che le posseggono

T F Anatomia del Porcino o Bolero edule e del bolete rubescente per me sempre perfetto

n°1. Porcino adulto ingrossato longitudinalmente

2 Boletino debolmente ingrandito

3 Due ordini di tubuli frotti dal rubescente, e staccati dal loro stucci

Digitized by Google

n °4. Un quadrato di tubuli del peranio subito ingrandito, e tinginti da ambe le parti

5 Superficie alveolare su cui riposano le estremità dei tubuli, presso stanno i denti negli alveoli, dai quali stacci si possono ingl ere con facilità i tubetti

6 Un tubulo di porcino edule ornamentato straordinariamente, avente attorno al suo orifizio un ordine di utricoli entro cui stanno le sporule e corpi riproduttori

7 Altro tubo aperto anteriormente per cui si vedono inoltrissimi utricoli sopra la membrana fruttifera dritta sorbe sinonio a *soprafare* plarentore

T. G ANATOMIA DEGL AGARICI

n °1. Pileolo rovesciato dall agaricus semipetitus,

2 Suo peduncolo cavo,

3. Pileolo dell agaricus nesarus

4. Suo peduncolo cavo

5 Pileolo di un ragnino o oloomentaiolo

6 Suo pedunculo

7. Cappello rovesciato dell agarico comune o rancio giallo buono in prima età colla cortina tuttora adesa allo pedicola del cappello

8 (Foglietto del suddetto tre Agaricci forniti di sporule, per vedere ove possano le sporule o i suoi detti corpi riproduttori

T. H In questa tavola si osserva la situazione delle sporule nei generi seguenti Hygrocybe, Hygrophorus, Nyctalis, Volvaria Clavaria, Pezziza questi formano l ordine A° spreadi il relebre Peyer, perchè i corpi riproduttori sono entro le teche

T. I Modo col quale si somministrano le sporule o corpi riproduttori nelle differenti specie di funghi spettanti ad alcuno la nigiar, nelle quali sono stati compresi da diversi autori relebri

T. K Conversione della cortina membranosa nell anulo o corolla

n °1 Cuoco giallo buono colla cortina lacerata in vari punti per andare a formare l Anello

2 Prataiolino buono colla cortina quasi intiera

3 Cucchetto giallo buono colla cortina solitaria da una parte

4 Prataiolo bianco, e pallido di neve rimosso da tutte le parti

5 Altro prataiolo sezionato per vedere come si comporta la cortina, cioè, che succhiando le fogliette da tutte le parti onde imprendere il dispendimento delle sporule fino alla loro completa maturità

6 Cortinario nevoso un velo aracnoide in luogo di cortina, arricciato con linee ornamentate che si vedono attorno al gambo le quali non sono che gli avanzi della cortina fugace ordinata in che distinguesi tra i detti agaricci cortinati del *Persoon*

7) Due esempi di anulo membranoso di-

8) scendente

9 Anulo adsoadente

10. Anulo discendente di altra fatta

T. L Osservazioni sull imbibizione con diversi liquidi colorati non rammina o cammina, tredrati a mostrare, se le cellule delle fibre delle quali si compone il piede dei funghi sono *vere fibre* o piuttosto vasi o cellule allungate ferenti le finzanni di vasi in divido l opinione del *Mirbel* (vedi il suo manoscritto intitolato Micologia Sanese, o Elementi di carcologia)

T. M Si pone in tutta evidenza sostenere siccome alcuni Micologi affermano che ove nascono le specie buone difficilmente allignano le sgrue cattive? In un mio boschetto a querci detto costaquercia accanto al fiume Arbia, di non grande estensione, vi ho trovato tutte le Specie rappresentate in questa tavola — I fatti manifesti gli scettici pochi vi sono dei luoghi buoni dei sospetti e dei velenosi

T. N Anatomia di un prataiolo buono verebia Nella carne del cappello vi si vedono delle grandi cellule rotonde, e nel gambo delle cellule allungate.

CATALOGO

DELLE

TAVOLE IN RILIEVO E DELLE SPECIE CHE VI HO RAPPRESENTATE

T. 1 N.°1 Fatinaccio toscano.
2 Uovolo giallo buono
3 Uovolo bianco bulboso o cocco velenosissimo.
4 Cocco verde ovi bulboso velenosissimo.
5 Pantarino velenoso.
6 Uovo rosso, o loino cucco rosso, o innocente velenoso
7 Cucchetto giallo o cedrino bulboso velenoso.

SVILUPPO DELLE SPECIE

T. 2 Cucco giallo buono, lo tutto le fasi dello vito, e spaccati.

T. 3 Uovolo Rosso, cucco falso o agarico muscario con tutti i suoi cambiamenti, e spaccati

T. 4. A Agarico pantherino con spaccati velenoso

T. 4 B Lo stesso in diverse forme e maturità con spaccati

T. 5 A Cocco bianco bulboso velenosissimo, agarico vernale, o di primavera, con spaccati.

T. 5. B Lo stesso in diversa età onde formare un idea chiara di queste lunga terribile.

T. 6. Cucco giallo o citrino, bulboso, velenoso, in tre varietà

T. 7. Cucco verde bulboso velenosissimo in due varietà.

T. 8 Fungo verde del pistoiese bulboso con lembo rosso, velenossimo

T. 9 N.°1 Amanita candida Bergonii.
2 Agarico nocivo.

T. 10. 1 Agarico cinereo, con sparrato
2 Agarico fulvo, albicante Ambi sospetti

T. 11 A. Farinaccio lorano buono

T. 11. B. Cucolla bianca buono, se tolte le sue forme

T. 12 Agarico di cesenne agarico rosso e n sparrato in questione, ma si sostiene mangereccio

T. 13 Agarico aspero con sparrato, velenoso Somiglia l onferderia, e in ai può cavlo idare raso facilità.

T. 14 N.°1 Agarico macchiato di piccardia
2 Agarico cruce di malta
3 Agarico angiuso
4 Agarico vaccinato Tutti velenosi

T. 15 Agarico strobiliforme per alcuni in questione, e p r altri buono

T. 16. 1 Agarico marcaotifero
2 Agarico maculato
3 Agarico vivoso
4 Purpurina nero puntata Tutti pericolosi

T. 17. 1 Agarico ecchinocefalo
2 Purpurina orinosa Ambi pericolosi

Digitized by Google

T 18 A Agarico o rolubolno con irili i suoi cambiamenti — Buono

T 18 B Agarico excoriato in due età

T 18 C n°1. Agarico procero
2. Agarico excoriato.
3. Agarico clypeiformis — Sospetto. Tutti carnite in qualche tavola per formarne un idea più chiara raccolto tra loro molto somiglianti, ma diverse nelle proprietà rassomiglianze dubbio. I nll'ma ossia il Clypeolario

T. 19. Agarico cacosmo in tre età con speccature — Pericoloso.

T 20 n.°1 Agarico lepiocefalo
2 Agarico rivale Ambi pericolosi

T 21 n.°1 Agarico rodipeto livido
2 Agarico vaginato fulvo. Il primo si dice mangerecci, ed il secondo pericoloso... perchè può sbagliarsi con altre specie collivo.

T 22 n°1 Agarico rodipeto peloso
2 Agarico ostoideo
3 Agarico vaginato. — Buoni

T 25 Agarico lelcotite in due età buone, e con speccate

T 24 Agarico ostreodio Senese, così chiamato dal popolo. Questo fungo eccellente pel suo fragrosso e sapore ingiuglie il prugnolo... ne pel difetto di qualche carattere, non osa consigliarsi nella scuola primulus tel è il suo scolorirsi

T. 25 n°1 Agarico nicheliano.
2 Agarico silecologio
3 Agarico nebuloso — Dubbi

T 26 Agarico piangente o lacrimabondo in gruppo in tutte i età Pericoloso —

T 27 A Agarico cauticino in gruppo Nel seneso ed in Austria se ne fa uso... ma però o lavato o molte acque o scottato

T. 27 B Agarico melleo che in colli Schaffer chiamerei melichlus o meglio proteus Si dice nocivo, ma preparato come il Candirino riesce adoperato dagli abitanti di Siroo e dell'r Compagna

T 28 n°1 Agarico giroviesco bianco
2 Agarico rassetto di rose.
3 Agarico capilla Tutti pericolosi

T 29 n°1 Agarico marzuolo sciro
2 Agarico roseniente bianco

n.°3 Agarico marzuolo marchiato dei foggi
4 Agarico violaceo, o fungo vedovo — Tutti buoni

T 30. A Prataiolo detto palle di neve con i suoi cambiamenti e spaccati

B. Prataiolo delle escrime di Virinio con spaccato, detto agarico Commestibile bruno

T 30. B Prataiolo squammoso di forma svariata, e suoi cambiamenti buono

T 30 C Prataiolo squammoso simile buono a gruppi in tutte l età fino all età decrepita tolto da una fregagno naturale.

T 30 D n°1 2. 3 Prataiolo rustico brizzato
4. Prataiolo scuro e suo
5 spaccato
6 Trovar coltivo e spaccato
7 Tubivo comune pericoloso Tutti da rigettarsi

T 31 Agarico cinato o Gregario od stramentario con irile quelle notazioni alle quali ne soggetto nel corso delle sue non lunge vita I cappelli ed altre melosi non sono mangerecci per gronto da errori si scrivenga il contorno

T 32 Prugnoli diversi indigeni ed esotici tutti eccellenti si per ribo quanto per condimento

Del n° 1 ed 11 prugnoli di Mocheri 12 Prugnolo ombellato. 13 Prugnolo crescente 14 Prugnolo rotondo bianco in gruppo Del 15 al 18 Prugnole bianco di Francia Del 19 ed 20 Prugnoli bianchi biscosi 21 Prugnoli di Moremann... e di monte Maggio.

T 33. n°1 Poliporo foglio ogherino bastardo
2. 3 Poliporo bianco solfurico
4 Polyporus falso Dal 5 all 14 Bigiarini dei Chiodi
12 Bigiarini dei Chiodi
1 Bigiarini sono buoni ma difficili a digerirsi, ed hanno bisogno di molta scrittura
15 Agarico cheade buono

T 34 n.°1 Agaricus fuscodes
2 Agaricus odorus amante — Buoni

T 35 n°1 Agarico omfalino
2 Agarico Tigrolo — Brrri

T 36 A. Agaricus sulphureus sotto varie forme — Non mangiabile

T 36 B Agaricus sulphureus, agarico fasciculato in gruppo non buono

Digitized by Google

T 36 C 1 2 Agarico amaro, Agarico aureo — si dice velenifico l'uno e l altro

T 37 Agarico pattuino o comunemente in gruppo. Non mangiabile.

T 38 n°1 Agarico cremito.
2 Agarico cerulino
3 Agarico ulmario
4 Agarico pelosino dei cedui
5 Agarico polono dei cedui. Tutti cattivi

T 39 Agarico semi globato cattivo

T 40. Agarico squarroso. Non buono

T 41 A Agarico fusiforme Buono —
Il Senese è molto abbondante in varietà di questo specie che ho eseguite in rilievo per il mio museo micologico.

T 41 B Agarico fusiforme cattivo. È di tessuto duro e stopposo.

T 42 n°1 2 Agarico viscino buono
3 4 Agarico ebuleo o bianco d avorio. Mediale
5 Agarico turbinoide. Innocuo
6 Agarico lazzolo Buono
7 Agarico delle tagliate buono

T 43 n°1 Agarico lilacinopallo.
2 3 4 5 Igrocibe di aspetto mediale che può prendersi per il virgineo innocente
6 Agarico pistolese bianco, o imbutino bianco cattivo
7 8 Agarico valente cattivo, si dubbio di queste due varietà presso che uguali

T 44 Agarico covera donata indelino

T 45 n°1 Agarico impudibilifonso in due varietà cioè albo e roseo.

T 46. A. Agarico peccato acre in due stati buono La cottura lo rende buono

T 46 B Agarico controverso acre in due stati Si può preparare coll abilimone e sono sopra a spogliarella della pa ipanula nocivo

T 47 A Agarico delicioso in stato naturale. In questo ne sebbene nel Senese non se ne faccia conto dicesi che in altri paesi non è così

T 47 B. Agarico delicioso in fritaglia.

T 48 A. Agarico necrovo in tre età

T 48 B Agarico necatore o tossicoso che per me sono sinonimi che in me dica in contrario, veduto in tutte l età per meglio farsene idea esatta

Il nome di necatore, mi pare, che parli abbastanza, e scioglia qualunque dispute in quale fasse nausea di scambio di specie

T 49 n°1 2 Agarico pudendino
3 Agarico sordidellato
4. 5 Agarico urente.
6. 7 Agarico Pyrogalo.
8 Agarico vetorato tutti non i loro spaccati — Pericolosi
Si difidi sempre di tutti quei funghi che gemmo latte

T 50. n°1 2 Agarico lattaiolo dorato d autori. Si dice buono, ma può essere sbagliato con altra specie scoperta dal *Krapf* la quale è pericolosa.
3 4 Lattario zonato così in toscano debbo
5 6 7 Lattario canforato. Si dà per buono dal P Acatici
8 9 Lattario insutino notato toscano. — incerto
Non bisogna fidarsi di quei funghi che gemmano latte, poichè vi è di innocui avvelenati.

T 51 Agarico celebbo — cattivo

T 52 Agarico sanguigno in tutte l età non spaccato. — Pericoloso

T 53 A. Russula emetica io dettaglio.

T 53. B Russula emetica colle sue varietà

T 53. C Russula emetica d altro eto

T 53 D Russula emetica d altra forma
Siccome questo fungo ha dato luogo a non poche sconcordie, poichè finora nè può esser confuso e sbagliato con altre Russule che io certi momenti l assomigliano, per questo ho raddoppiati gli esemplari

— *Nota* —

Le foglinte Russule in quali vengono date per carattere lenne della rissula emetica, non è sempre da ritenersi con tutta sicurezza, poichè l età stessa la mutanza dal privisorio può condurci nell inganno, specialmente in vecchiaja

T 54 n°1 Russula revocata vende Cattivo
A. 2 Russula verde buona
3. Russula sapida buona
4 Russula albacea buona.
Si dice che le Russule buone devono avere costantemente la foglia tia gialla, ma ai Bosco quanto tanpantondole in Casa, si vede che in tutte le Russule il color della lamina dipende dall età e però è cacciere incauto

T 54 B n°1 2 Russula virescens fungo verdone italiano buono.
3. 4 Russula pellica poies buono ma può sbagliarsi univoltc coll egatico nocivo.
5 6 Russula vesca, o Russole mezzane Secondo Venturi è ommessa nel Mercato di Bruscin

— Nota —

La sezione Russula ha bisogno d'una grande riforma... e ciò l'ho rilevato dalla ripetutazione ed anche tenuta di dietro il Bresadola in tutto il Corso della vita di queste piante... e se emmi mai nulla mancando il loro numero

T 53 n°1 Amanita Ostreato, o fungo Gelone dei Toscani
2 3 Agarico palmato
4 Agarico Conglobato
5. 6 7 Agarico Ombellifera
dal 8 all'0 Agarico dell Erysipe Campestre o Calcelespedo, n Carbonello vulgare.
11 Agarico petaloide
Tutte specie buone
I presenti coadiuvano sempre l ommiliorum nel fungo dell Erngio, ma sono anche buoni

T 56 Agarico dell Erysipum n cui maniera di svilupparsi sopra le radice morte di questa pianta, comuni nelle stoppie presso il Bosco Arbio

T 57 Agarino Oleario, Orecchia d'olivo vecchia fosforescente in tempo di notte allorchè si disfà, spargendo luce fosforico Velenoso

T 58 Agarico Stittico velenoso

T 59 Agarico palmato. — Buono

T 60. Agarico Olmario — Si dice buono

T 61 n.°1 2 Cantarello bianco o Galliaccia bianco buono. Dore o dignumm
3. 4. Cantarello cinnum, o Collinaccio giallo ombrino, Giallarello virilissima
5 6 Cantarello nelore del tacolo dell'ovo crespato

T 62 n°1 2 Cantarello con piede nero
3 Cantarello Zonato
4 Cantarello cervellerente sospetti tutti

T 63 Merulio cornucopioide o Trombette di morto, sospetto

T 64 Polyporus frondosus Poliporo fondoso, buono

T 65 Poliporo piede di Capra per similitudine al piede di quest animale buono.

T 66 Poliporo tuberastro o Boletus tuberastus mandrinum da Sebasto. buono, detto fungo della pietra fungaja.

T 67 Poliporo acantoide di Monticoli cresce sarisantomentin ed è hanotessimo

T 68 Poliporo cristito di Monticoli, cresce immonumentin quanto l' antecedente, ed n ugualmente delinote e di buon odore.

T 69 Poliporo pel sole. I contadini delle Cacin smesso le toglione o latin specialmente quand è giovane; e lo mangiano saporitissimo;

T 70 Boleto o porcino mucgareccio in tutte l età dalla vite con spaccati

T 74. Boleto o suricin ustulato buono in dettaglio non spaccati

T 72 Boleto o pomino crepato buono non vuoti età e spaccati

T 73 Boleto n sorcino color castagno buono, con tutti i rimbonimenti di età, n spaccati

T 74. Boleto o porcino flavo italiano buono in tutte l età con spaccati.

T 75 dal 1 al 4 Boleto aureo buono.
dal 5 al 10 Boleto oraticato in tutte l età, ed anche buono.

T 76 Boleto edore buono con spaccato, buono lo dettaglio ed in gruppo con spaccati.

T 77 A. n°1 2 Boleto o porcino, o coppinillo bianco buono dei toscani
3. 4 Boleto bianco-cinerescente non buono.
5. 6 Boleto bianco-verde toscano non buono

T 77 B 4. Boleto albino, 2 Boleto cianotico Sospetti.

T 78 n°1 2 Boleto pachipo, o piccozzo mugnaino mezzanello di gambo grosso dei toscani, buoni
3 4. Boleto castagno o corvo buono.

T 79 n°1 Boleto bubon. Buono.
3 4 Boleto regio.
Il Micologo Fentrari nomina che questa dna specie sono egualmente buone.

T 80 1 Boleto scabro in due varietà cioè:
4 Boleto scabro nelore d' ocracio.
2 Boleto scabro fosco-albo o leucofeo. —

Digitized by Google

Albercllo albatrello o porciacllo dei toscani Ambi buoni

T 81 Dal 1 al 4 Boletus perniciosus
5. 6. 7. Boletus tuberosus bulbo malefico toscano.
8 9 Boletus flavescens
Si dirr che il Boletus tuberosus sia uno varietas del Boletus edulis mo lr sua polpa sempre rrde secchra non sa mettirrlo

T 82 n.ri 2 Boletus calopus, bolete terreo.
3 Boletus olivaceus.
Ambi sospetti

T 85. Boletus badhamii-Solanes. An varietas rubcolrri Persoonio

T 84 n.ri 2 Boletus crisenteron, cattivo
3 Boletus cattanus. Varietà del bolete buono.

T 85. 1 Boletus felleus 2 Boletus piperatus
3. Boletus viscidus Tutti rallivi.

T 86. n.ri 1 2 Boletus papillosus. Cattivo
3. 4. 5 Boletus del noce o bubrius Inglandis. Non buono, ma alcuni lo dicono buono.

T 87. Boletus colubrinus cutaneus malsgno Vrlerom, o porcini cambir colorr Il lrrrltorio Scnese è rlcchissimo di cuesir funghi e varrirà Bubrius mucronatus

T 88 Boletus pseudotubulosus tossico in due vrlrcla cno rparcsti

T 89. n.ri 2 3. Boletus ovinus
4 Boletus luteus colla rortlos e coll anello Buoni

T 90 n.ri 1. 2 3 4 Boletus color d arancio italiano. Si può lo qualche rasa sbogliare col bolrto scabro rolor d'arancio, ma sono ambi buoni
5 Boletus crocipodius Gli antori assicurano rhe può mrng orsi ma lra noi è rrrissimo Alcuni lo confondono col Bol granulatus ma sono ben differenti, l'uno dall altro

T 91 A Fistulina in gruppo sulle qorrce

T 94 B Fistulina di crolagno d altra locnie, buone quind è giovane

T 92 A. n.ri 1. 2. Hydnum repandum. Dentellino dorato buono dei toscani.
3 Hydnum blanco Denirllino bianco buono
4. Hydnum testa di negro Fungo irlrirr dei toscani buono.
5. 6 Hydnum ferrugineum buono.
7. 8. Hydnum cervinum buono.
9 Hydnum coralloides. Dentino corallo dei toscani, o dentino ramoso.

T 92 B. n.ri 1 Hydnum ferrugineum, denirllino o stecchcino maggiore mairtro.
2 Hydnum color cinnamomeum, sospritto.
3. Hydnum pelusum Sospritto.
4. Hydnum repandum. Strecchcrino malefico rrspitoso.
5. Hydnum rufescens. Si dirr rhr io lo arrosa si mrngia ma non è vero
6. Hydnum rosso Dentello o rossa Sospritto

T 95 A n.ri 1. Morchella esculenta spugnolo ceciato di rapo tondo toscano o morillo commestibile
2 2. Morchella conica e spugnolo affinnirolo o nero commestibile
3 3 Morchelle recona. Phallus undosus Spugnola di rapo tondo recirto. Buono.
4 Morchella conica — spugnolo costato Buono
5 5 Morchella semi-libera o trippello romano Morillo o metà libero; buono.

— Nota —

A requsto di queste grorrcsli Gli Scrittn ha lrrmrtrato altri, poco dello Vrrsa, perchè in questo I intenzione è aprrto (olor ornamento) mentre nel gcorro morchella l'inclcolore è sorrois offrrsa rl gambo

T 93. B n.ri 1 2 Leotia
3. Verpa speciosa Wrlladini

T 95. C Verpa pentalipodius *Krombholtz* in tre età rom i suol rpaccati.

T 94 n.ri 1. Helvella elastica.
2 Helvella semensis.
3 Helvella crispa. Inoiir
4. Helvella stipocrate rilormis
5. Helvella crispa Mitra
6 Helvella carbonica, o pasta Stringa. Tutte buone.

T 95 A Mrzza d ercole cecista to inite l rià r con I suoi rambiamrnti Cattiva.
Alcnol micologi lr credono buona, ed altri lo organo

T 95 n.ri 1 Clavaria lutea — Ditola o mazzone B girllo dei Toscani. Buona.
2 Clavaria alba — Ditola bianca, buona
3 Clavaria Botrytis — Ditola rossastra buona
4 Clavaria Amethystina, rara, ma buona
5 Clavaria sanguinea, Ditola Gorrllino buono ma rarissimo

T 96 Peziza tophicola
n.ri 4 Nasrente o orlla Volva

Digitized by Google

T 96 n.° 2 Spezzato.
3 Folle maturo entro la Volva.
4 Sconnesso dalla Volva.
6 Corpi riproduttori Cotilivo.

T 97 n.° 1 Clathrus ovinus non sviluppato, ossia entro la Volva.
2 Sua sezione.
3. Adulto, e maturo.
4. Fusa poc decrepitezze
5. Volva separata.
6. Uno strato di Corpi riproduttori Cotilivo.

Lycoperdon
o Vesce

T 98 n.° 1 Lycoperdon coelatum, o
A 2 Suo spaccato.
3 Lycoperdon bovistatum, e
4 Suo spaccato.
5 Lycoperdon Peripoeos opimissimum
6 Lycoperdon Proteiforme
7 Lycoperdon giganteum
8 Lycoperdon Villosum
9 Lycoperdon pulveraceum
Tutte le Vesce quando sono giovani, e che inghiotte ancora la loro carne bianca possono mangiarsi, ma se vi è cambiamento di colore possono nuocere.

T 98 n.° 1. Lycoperdon bovista serrato.
B 2 Il medesimo aperto colla carne sana, e colle sue membrane sollevate
3 Porzioni del suddetto nel quale manca la gleba e vi si vedono nel fondo certe le impronte del Capillizio
4 Tecche contenenti i Corpi riproduttori, e ciò per formarsi un idea.
5 Capillizio separato dalle Sporule.
Dal 4.° al 8.° diversi pezzetti dell'Epidermide tratti o staccati da cinque varietà di Vesce, che ne formono il carattere distintivo.

T 98 n.° 1 Lycoperdon Capitatum.
C Vescia falsa.
2 Una fruttuccia della medesima allo stato di freschezza
3. Osservansene sulla rossicopiche moderne sul modo di comportarsi i Corpi riproduttori in queste piante

T 98 Lycoperdon Capivatum — Vescia falsa,
D Vescia Lupaja dei Toscani
n.° 1 Una Vescia Lupaja aventi il peridio scoperto artificialmente con un taglio in croce per vedere di quante membranne costa, e per lor conoscere in ciò che dalli riscono le grace vere dalle false
2. 2. Due fruttuccie della medesima osservate in tempi diversi.
3 Vedute in grossezza allo maturazione.
4. Una Teca tagliata nel mezzo per osservarvi i Corpi riproduttori contenuti nel suo interno.
5 Uno Strato di Sporule con capillizio

T 99 Tuber Cibarium
n.° 1 Tartufo in gruppo, e suo sporcalo.
2 3. & 5. Modo, forma, e posizione dei corpi riproduttori secondo gli autori dei quali divido l opinione.

Sono questi i Generi, le specie e le varietà dei funghi, che hanno da molti anni fermata la mia attenzione, perchè oppunto tra questi ve ne sono non pochi, i quali possono compromettere la salute pubblica, e ciò di rado senza riparo. — *sunt multa mixta bonis, sunt bona mixta malis.*

12a

ERRORI	CORREZIONI
pag 3 verso 14 per il dupsacere	il dispiacere
pag. 9. colonna 1. ver 44. Agarico neceavot	Agarico negatore
pag 9 colonna 2 ver 53 in Case	in Casa
pag 11 colonna 1 ver 14 Boletus marmoreus-Solanes	Boletus marmoreus Solanes
pag 11 colonna 2 ver 17 Morchella rudosa	Morchella undosa



CUCCO GIALLO BUONO

CUCCO FALSO O MUSCARIO VELENOSO